

# KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex 100g



## Zusammensetzung und Wirkungsweise:

100g KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> enthalten: 200 mg Teflubenzuron und 800 mg Diflubenzuron zum Einmischen in das Wasser / Beimischen ins Futter.

Die in KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> enthaltenen Wirkstoffe hemmen die Chitinsynthese, in der Folge die Ei-Bildung und weiterhin die Häutung der juvenilen Parasiten zu adulten Tieren. Es handelt sich damit nicht um ein schnell wirksames Kontaktgift.

Wegen der schonenden Wirkweise ist der Wirkungseintritt erst nach ca. einer Woche festzustellen.

## Anwendungsgebiet:

KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> ist ein Präparat zur Behandlung von Zierfischen, insbesondere Koi. Es kann gegen parasitäre Krebstiere (Crustacea), wie Karpfenlaus (*Argulus sp.*) und Ankerwurm bzw. Stäbchenkrebs (*Lernaea sp.*) eingesetzt werden. Für weitere Indikationen fragen Sie bitte Ihren Händler oder Fachtierarzt.



Mikroskopisches Bild (10x) von *Argulus sp.* Diese parasitierenden Krebstiere (4 – 8mm) sind von Auge auf Haut und Flossen erkennbar.

Folgende Symptome und Verhaltensmuster werden häufig in Zusammenhang mit einem Befall mit parasitierenden Krebstieren beobachtet:

*Argulus*: 6 - 8mm grosse, rundlich abgeflachte Parasiten; blutige Einstichstellen.

*Lernaea*: Entzündete Hautstellen, bei genauem Hinsehen „längliche Fäden“ (bis 1cm lang) auf der Fischhaut erkennbar.

**Teichbehandlung** mit KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> 100g für 20'000L:

KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> 5 g auf 1'000 Liter Teichwasser. In aller Regel reicht die einmalige Behandlung des Teichwassers aus. In stark strukturierten Teichen (sehr großer Filter, viele Pflanzenbestände etc.) kann die Dosis verdoppelt werden (10 g pro 1'000 Liter). Hier empfiehlt sich auch eine Wiederholung der Dosierung bei einer Teichwassertemperatur unter 15°C am 21. Behandlungstag, bei einer Wassertemperatur von über 15°C am 14. Tag.

## Untermischen in das Futter:

Bitte dosieren Sie KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> 10 g pro 1 kg Futter. Zur besseren Haftung empfiehlt es sich zunächst, das Futter z.B. mit Fischöl klebrig zu machen. Anschliessend streuen Sie KOI MED<sup>®</sup> Louse-Ex<sup>®</sup> gleichmäßig darüber. Wenn die Fische gut fressen, sollte die Futtermischung mindestens eine Woche lang gefüttert werden.

## Zu beachten:

Bitte lesen Sie die dem Arzneimittel beiliegende Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Fachtierarzt.